FICHE PRODUIT



BIOLABO EXATROL-N Taux 1 (10 x 5 mL)

Référence : SOC-95010

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

BIOLABO EXATROL-N Taux 1

Conditionnement: 1 flacon sérum bovin lyophilisé et 1 flacon de diluant

LES ANALYTES SONT:

Enzymes : ALT (TGP), AST (TGO), Amylase, Gamma-GT, Phosphatases acides totales (PAT) et prostatiques (

PAC), Phosphatase Alcaline (PAL), Lactate déshydrogénase (LDH), Créatine Kinase (CK), Lipase pancréatique

Electrolytes : Calcium, Chlorures, Fer, CTF, CLF, Magnésium, Phosphore Inorganique.

Protéines : Protéines Totales, Albumine

Lipides : Cholestérol Total, Triglycérides (TG)

Substrats : Bilirubine totale et directe, Créatinine, Glucose, Urée, Acide Urique.

Les enzymes ajoutées sont d'origine animale. Les concentrations/activités de chaque analyse sont spécifiques du lot et situées dans le domaine de la normale ou à la limite du domaine normal/pathologique.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

STABILITE ET CONSERVATION

Conserver à 2 - 8°C, dans le flacon d'origine bien bouché et à l'abri de la lumière.

Avant ouverture : Les sérums lyophilisés (flacon R1) et le diluant (flacon R2) sont stables jusqu'à la date de péremption indiquéesur l'étiquette. Flacon R2 : stocké et utilisé comme indiqué dans la notice, dans le flacon d'origine bien rebouché et en l'absence de contamination, le contenu du flacon R2 est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette du flacon.

Sérum reconstitué : Transvaser la quantité nécessaire, bien reboucher le flacon et stocker à 2-8°C. Dans ces conditions, les constituants sont généralement stables pendant :

8 heures à 15-25°C.

7 jours de 2 à 8°C.

1 mois à –20°C. Aliquoter et congeler une seule fois.

Sauf cas particuliers :

1- Bilirubine, CK, LDH : diminution de 1-2 % par semaine à –20°C.

2- LDH : diminution de 3 % par 24 h à 2-8°C.

Ne pas utiliser un sérum reconstitué s'il est trouble ou si l'absorbance du sérum dilué (1+19) dans NaCl 9 g/L mesurée à 600 nm est > 0,060.

Ne pas utiliser un sérum reconstitué après la date de péremption indiquée sur l'étiquette du flacon

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/reactifs/12108-biolabo-exatrol-n-taux-1-10-x-5-ml.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.